

Händedesinfektion

- zur Händedesinfektion und für Kühllumschläge
- **2-Propanol 70 % (V/V) Lösung**
- **dermatologisch bestätigte Hautverträglichkeit**
- **frei von hautreizenden Langzeitwirkstoffen**
- **parfümfrei · begrenzt viruzid**

Charakteristika

Alkoholisches, parfümfreies Desinfektionsmittel zum Einreiben in die Hände. Ohne kumulierende Langzeitwirkstoffe oder sonstige Zusatzstoffe, daher sehr hautverträglich. Dermatologisch getestet. Empfohlen für haut- bzw. allergieempfindlichen Personen.

Anwendungsbereiche / Handhabung

Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion.

- Hygienische Händedesinfektion
gemäß VAH/EN 1500 konz. 30 s
- Chirurgische Händedesinfektion
gemäß VAH/EN 12791 konz. 1,5 min
gemäß Arzneimittelgesetz konz. 5 min

Für Kühllumschläge ist die Lösung mit gleichen Teilen Wasser verdünnt anzuwenden.

Gegenanzeigen

INTERMED Händedesinfektion ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt.

Nebenwirkungen

Beim Einreiben der Haut können Rötungen und leichtes Brennen auftreten.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch bei Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurz-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn (www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten:

- wirksamer Bestandteil: 2-Propanol 63,1 g
- sonstiger Bestandteil: gereinigtes Wasser

Mikrobiologische Wirksamkeit

- bakterizid
- tuberkulozid
- levurozid
- Rota-Viren inaktivierend
- begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-Viren)

Listung und Zulassung

- VAH-gelistet
- Zugelassen nach AMG in Deutschland (Zu.-Nr.: 1599.98.99)

Besondere Hinweise

Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erschwernissen (z.B. feuchte Haut, Verschmutzungen der Haut, Risiko des Eingriffs) sind die Einwirkzeiten zu verlängern.

Warnhinweise: Leicht entzündlich! Von Zündquellen fern halten! Dicht verschlossen lagern. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z.B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Lieferformen

500 ml-Flasche	Best.-Nr.: 213941
1 l-Flasche	Best.-Nr.: 210041
5 l-Kanister	Best.-Nr.: 210015

Händedesinfektion

- zur Händedesinfektion und für Kühllumschläge
- 2-Propanol 70 % (V/V) Lösung
- dermatologisch bestätigte Hautverträglichkeit
- frei von hautreizenden Langzeitwirkstoffen
- parfümfrei · begrenzt viruzid

Wirkpektrum und Einwirkzeiten

Wirksamkeiten und Prüfmethode			15 s	30 s	1 min	1,5 min	3 min
Händedesinfektion							
Anwendungsempfehlung zur Hygienischen Händedesinfektion*	EN 1500 / VAH			■			
Anwendungsempfehlung zur Chirurgischen Händedesinfektion*	EN 12791 / VAH					■	
Hygienische Händedesinfektion im Seuchenfall gemäß IfSG	RKI	Wirkungsbereich A		■			
begrenzt viruzid	RKI/DVV/ EN 14476			■			
mykobakterizid (M. avium und M. terrae)	EN 14348	niedrige und hohe Belastung		■			
ergänzende Prüfergebnisse							
wirksam gegen Rotaviren	EN 14476	niedrige und hohe Belastung	■				
wirksam gegen Noroviren (MNV)	EN 14476	niedrige und hohe Belastung			■		
tuberkulozid (M. Terrae)	EN 14348	niedrige und hohe Belastung	■				
bakterizid	EN 13727	niedrige und hohe Belastung	■				
levurozid (Candida albicans)	EN 13624	niedrige und hohe Belastung	■				

* einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

INTERMED Händedesinfektion

Wirkstoff: 2-Propanol 70% (V/V). Alkoholische Hautdesinfektion.

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: 63,1 g 2-Propanol. Sonstiger Bestandteil: gereinigtes Wasser.

Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, Kühllumschläge.

Gegenanzeigen: Nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet.

Nebenwirkungen: Beim Einreiben der Haut Rötungen und leichtes Brennen möglich.

Warnhinweise: Leicht entzündlich! Von Zündquellen fernhalten! Dicht verschlossen lagern. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie die Beseitigung von Zündquellen. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Pharmazeutischer Unternehmer: Dr. Schumacher GmbH, Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld, Tel. 05664/9496-0, info@schumacher-online.com.

Stand: 02/2022.